

2015年 数学 IIB 第2問

2 次の問いに答えよ。

- (1) 関数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ の $x = a$ における微分係数 $f'(a)$ を求めよう。 h が 0 でないとき、 x が a から $a+h$ まで変化するときの $f(x)$ の平均変化率は $\boxed{\text{ア}}$ + $\frac{h}{\boxed{\text{イ}}}$ である。したがって、求める微分係数は

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow \boxed{\text{ウ}}} \left(\boxed{\text{ア}} + \frac{h}{\boxed{\text{イ}}} \right) = \boxed{\text{エ}}$$

である。

- (2) 放物線 $y = \frac{1}{2}x^2$ を C とし、 C 上に点 $P(a, \frac{1}{2}a^2)$ をとる。ただし、 $a > 0$ とする。点 P における C の接線 l の方程式は

$$y = \boxed{\text{オ}}x - \frac{1}{\boxed{\text{カ}}}a^2$$

である。直線 l と x 軸との交点 Q の座標は $(\frac{\boxed{\text{キ}}}{\boxed{\text{ク}}}, 0)$ である。点 Q を通り l に垂直な直線を m とすると、 m の方程式は

$$y = \frac{\boxed{\text{ケコ}}}{\boxed{\text{サ}}}x + \frac{\boxed{\text{シ}}}{\boxed{\text{ス}}}$$

である。

直線 m と y 軸との交点を A とする。三角形 APQ の面積を S とおくと

$$S = \frac{a(a^2 + \boxed{\text{セ}})}{\boxed{\text{ソ}}}$$

となる。また、 y 軸と線分 AP および曲線 C によって囲まれた図形の面積を T とおくと

$$T = \frac{a(a^2 + \boxed{\text{タ}})}{\boxed{\text{チツ}}}$$

となる。 $a > 0$ の範囲における $S - T$ の値について調べよう。

$$S - T = \frac{a(a^2 - \boxed{\text{テ}})}{\boxed{\text{トナ}}}$$

である。 $a > 0$ であるから、 $S - T > 0$ となるような a のとり得る値の範囲は $a > \sqrt{\boxed{\text{ニ}}}$ である。また、

$a > 0$ のときの $S - T$ の増減を調べると、 $S - T$ は $a = \boxed{\text{ヌ}}$ で最小値 $\frac{\boxed{\text{ネノ}}}{\boxed{\text{ハヒ}}}$ をとることがわかる。