



2014年第4問

4 平面上の直線  $\ell$  に同じ側で接する 2 つの円  $C_1, C_2$  があり、 $C_1$  と  $C_2$  も互いに外接している。 $\ell, C_1, C_2$  で囲まれた領域内に、これら 3 つと互いに接する円  $C_3$  を作る。同様に  $\ell, C_n, C_{n+1}$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ) で囲まれた領域内にあり、これら 3 つと互いに接する円を  $C_{n+2}$  とする。円  $C_n$  の半径を  $r_n$  とし、 $x_n = \frac{1}{\sqrt{r_n}}$  とおく。このとき、以下の問い合わせよ。ただし、 $r_1 = 16, r_2 = 9$  とする。

- (1)  $\ell$  が  $C_1, C_2, C_3$  と接する点を、それぞれ  $A_1, A_2, A_3$  とおく。線分  $A_1A_2, A_1A_3, A_2A_3$  の長さおよび  $r_3$  の値を求めよ。
- (2) ある定数  $a, b$  に対して  $x_{n+2} = ax_{n+1} + bx_n$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ) となることを示せ。 $a, b$  の値も求めよ。
- (3) (2) で求めた  $a, b$  に対して、2 次方程式  $t^2 = at + b$  の解を  $\alpha, \beta$  ( $\alpha > \beta$ ) とする。 $x_1 = c\alpha^2 + d\beta^2$  を満たす有理数  $c, d$  の値を求めよ。ただし、 $\sqrt{5}$  が無理数であることは証明なしで用いてよい。
- (4) (3) の  $c, d, \alpha, \beta$  に対して、

$$x_n = c\alpha^{n+1} + d\beta^{n+1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

となることを示し、数列  $\{r_n\}$  の一般項を  $\alpha, \beta$  を用いて表せ。

