



2011年薬学部第3問

3 実数を成分とする行列  $A = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & c \end{pmatrix}$  は  $A^2 - A + E = O$  をみたすとする。ただし、 $E$  は 2 次の単位行列、 $O$  は 2 次の零行列を表し、 $b > 0$  とする。このとき、次の問いに答えよ。

(1)  $b$  と  $c$  を、それぞれ  $a$  を用いて表せ。

(2) 2 つのベクトル  $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  と  $A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$  が垂直であるとき、行列  $A$  を求めよ。

(3)  $A$  を (2) で求めた行列とする。1 個のさいころを 2 回投げて、出た目を順に  $l$ ,  $m$  とする。このときベクトル  $P_0, P_1, P_2, P_3$  を次のように定める。

$$\bullet P_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, P_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\bullet P_2 = P_1 + A^l(P_1 - P_0)$$

$$\bullet P_3 = P_2 + A^m(P_2 - P_1)$$

このとき、 $P_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  となる確率を求めよ。