

2014年薬学部(薬) 第1問

1 放物線 $y = x^2$ 上の2点 $A(a, a^2)$, $B(b, b^2)$ ($0 \leq a < b$) に対して, $L(a, b)$ を線分 AB の長さとし, $S(a, b)$ を線分 AB と放物線 $y = x^2$ で囲まれた図形の面積とする. さらに, $T(a, b)$ を $a \leq x \leq b$ の範囲で放物線 $y = x^2$ と x 軸で囲まれた図形の面積とする.

(1) (i) $L(0, t) = \frac{1}{2}L(0, 1)$ となるのは, $t^2 = \frac{1}{\boxed{\text{ア}}} (\sqrt{\boxed{\text{イ}}} - \boxed{\text{ウ}})$ となるときである.

(ii) $L(0, t) = L(t, 1)$ となるのは, $t = \frac{1}{\boxed{\text{エ}}} (\sqrt{\boxed{\text{オ}}} - \boxed{\text{カ}})$ のときである.

(2) (i) $S(0, t) = \frac{1}{2}S(0, 2)$ となるのは, $\log_2 t = \frac{\boxed{\text{キ}}}{\boxed{\text{ク}}}$ となるときである.

(ii) $T(t, 2) = S(0, 2)$ となるのは, $\log_2 t = \frac{\boxed{\text{ケ}}}{\boxed{\text{コ}}}$ となるときである.